

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Nadelgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Abies alba	frisch, humos	- wichtiger Waldbaum, als Christbaum
Tanne, Weiss-Tanne	Aussaart, Sorten durch Veredeln	- empfindlich auf Trockenheit und Luftverschmutzung
	einheimisch , Mittel-Südeuropa	- Tiefwurzler, Zapfen aufrecht stehend
Pinaceae	Mai	- spätfrostgefährdet - LB: 7.3.2.1 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Abies nordmanniana	frisch-feucht, schwach sauer	- schnellwachsend, als Weihnachtsbaum sehr beliebt
Nordmanns-Tanne	Aussaart	- empfindlich gegen Hitze und Trockenheit
	Kaukasus	- in der Jugend spätfrostgefährdet
Pinaceae	Mai	- Zapfen aufrecht stehend - LB: 7.3.3.1 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Cedrus deodara	frisch, sauer-neutral	- Wuchs breit kegelförmig, Zweige überhängend
Himalaya-Zeder	Aussaart	- dichte, graugrüne Benadelung
	Himalaya, Afghanistan	- Solitär, Parkbaum
Pinaceae	September-Oktober	- als Jungpflanze wenig frosthart - LB: 7.2.1.1 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	frisch-feucht, sandig - lehmig	- Solitär, Hecken, kompakt-pyramidale Form
Lawsons-Scheinzypresse	Steckling	- bläuliche Zweige
	Cultivar (USA-Nordwesten)	- Zapfen kugelig, hart
Cupressaceae	März-April	- LB: 9.3.3.3 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'	frisch-feucht, schwach sauer	- gelbgrüne Benadelung
Sawara-Scheinzypresse	Stecklinge	- Solitär und Gruppen
	Kulturform (Art in Japan)	- LB: 9.2.2.4 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Cupressaceae	März-April	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Nadelgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Ginkgo biloba	trocken-frisch, tiefgründig	- Solitär, in Gruppen, Alleebaum
Ginkgo, Mädchenhaarbaum	Stecklinge, Veredlung	- hitzeverträglich, industriefest
	China	- zweihäusig, Fruchtfleisch stinkt, essbare Nüsse
Ginkgoaceae	April-Mai	- Herbstfärbung leuchtend gelb
		- LB: 6.3.2.1 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Juniperus communis 'Green Carpet'	trocken-frisch, sauer-neutral	- langsam und breit wachsend
Teppich-Wacholder	Stecklinge	- Kleingärten, Dachgarten, Tröge
	Kulturform	- auch für Höhenlagen
Cupressaceae	April-Juni	- LB: 9.1.3.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Juniperus communis 'Hibernica'	trocken-frisch, durchlässig	- säulenförmig, langsamwüchsig, stadtklimafest
Säulen-Wacholder	Stecklinge	- Ziergehölz, Heide-, Steingärten, Tröge
	Irland	- frosthart, hitzeverträglich, anspruchslos
Cupressaceae	März-April	- LB: 9.1.3.4 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Juniperus virginiana 'Hetz'	trocken-frisch, durchlässig	- breit-aufrechter starker Wuchs
Grauer Strauch-Wacholder	Stecklinge	- robust und pflegeleicht
	Kulturform, urspr. Nordamerika	- Böschungen, Steingärten, auch als Formhecke
Cupressaceae	März - April	- LB: 5.3.2.4 (Heiden und Dünen)
Larix kaempferi	frisch-feucht, sauer - neutral	- Zapfenschuppen oben gebogen
Japanische Lärche	Aussaat, Sorten veredelt	- Tiefwurzler
	Japan	- Nadelabwerfend, gelbe Herbstfärbung
Pinaceae	April-Mai	- Parkbaum, grosse Gärten, div. Gartenbonsai-Sorten
		- LB: 7.2.3.1 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Nadelgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Metasequoia glyptostroboides	frisch-feucht, sauer-neutral	- Solitärparkbaum
Urweltmammutbaum	Stecklinge, Aussaat, Steckholz	- nadelabwerfend (sommergrün), goldgelbe Herbstfärbung
	China	- raschwüchsig, frosthart, schnittverträglich
Taxodiaceae	April-Mai	- kugelige Zapfen hängend
		- LB: 2.4.3.1 (Auen- und Ufergehölze)
Picea abies 'Nidiformis'	frisch-feucht,	- breiter, nestförmiger Wuchs, anfangs kugelförmig, später breitwüchsig
Nest-Fichte	Stecklinge	- Kleingärten, Dachgärten, Steingärten
	Kulturform	- LB: 9.3.3.7 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Pinaceae		
Picea glauca 'Conica'	frisch, durchlässig	- Ziergehölz, Einzelstellung,
Zuckerhut-Fichte	Stecklinge	- Friedhöfe , Tröge und Dachgärten
	Kulturform	- sehr langsam wüchsig, konischer Wuchs
Pinaceae		- heisse Standorte vermeiden, sonst anfällig auf RoteSpinne
		- LB: 9.2.3.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Picea omorika	trocken-frisch, durchlässig	- wärmeliebend, hitzeverträglich
Serbische Fichte, Omorika-Fichte	Aussaat	- schmaler Wuchs, so auch für kleine Gärten geeignet
	Balkan	- Solitär, kleine Gruppen
Pinaceae	Mai	- Flachwurzler, dadurch umfallgefährdet
		- LB: 6.3.3.1 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Picea pungens 'Koster'	trocken-frisch, l. sauer-alkal.	- empfindlich auf Hitze, Wintersonne
Blau-Fichte, Stech-Fichte, Blautanne	Stecklinge, Veredelung	- Solitär
	Kulturform	- wichtiges Schnittgrün für Trauer-, Weihnachtsbinderei
Pinaceae	April-Mai	- silbergraublaue Benadelung, stechend, hängende Zapfen
		- LB: 7.1.3.2 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Nadelgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Pinus cembra Arve, Zirbel-Kiefer Pinaceae	frisch, sauer bis alkal. Aussaart, Sorten durch Veredelung einheimisch, Mitteleuropa, Karpaten Mai	- sommerkühl, schlecht hitzeverträglich - 5 nadelig, essbare Samen - Baum des Hochgebirges - sehr frosthart - Solitär, kleine Gruppen, Heidegärten - LB: 8.2.3.2 (Bergwälder und Sträucher alpiner Bereiche)
Pinus mugo var. pumilio Kriech-Föhre, Zwerg-Kiefer Pinaceae	trocken-frisch, kalkliebend Aussaart Kulturform Juni-Juli	- breitverzweigter, dichter Wuchs - verträgt Trockenheit und tiefe Temperaturen - Rabatten, Böschungen, Steingarten, Dachgarten - durchlässige sandige Böden - LB: 8.2.1.5 (Bergwälder und Sträucher alpiner Bereiche)
Pinus nigra ssp. nigra Schwarzkiefer Pinus nigra austriaca Pinaceae	trocken-frisch, kalkliebend Aussaart, Sorten durch Veredelung Österreich, Italien, Balkan Mai	- breiter, dichter Wuchs - benötigt viel Platz - verträgt Sommertrockenheit - Solitär in Parks, grossen Gärten - anfällig auf Föhrenschütte und -triebsterben - LB: 8.2.1.1 (Bergwälder und Sträucher alpiner Bereiche)
Pinus parviflora 'Glauca' Blaue Mädchen-Kiefer Pinaceae	trocken-frisch, sauer-neutral Veredlung Kulturform (Art von Japan) April-Juni	- blaugrüne bis silberblaue Nadeln, 5-nadelig - bizarrer, malerischer Wuchs - schnittverträglich, empfindlich auf Staunässe - Tröge, Dachgärten, Garten-Bonsai - LB: 9.1.3.3 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Pinus sylvestris Föhre, Wald-Föhre, Wald-Kiefer Pinaceae	trocken-frisch, durchlässig Aussaart, Veredelung bei Sorten einheimisch Mai	- Borke abblätternd, rötlich, bläuliche Benadelung - Trockenheit ertragend, empfindlich auf Luftverschmutzung - oft malerischer Wuchs, Solitär, Pioniergehölz - Baum lichter Wälder - LB: 4.2.3.1 (Artenarme Wälder und Gehölzgruppen)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Nadelgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Pinus wallichiana	trocken-frisch, sauer-neutral	- 20-35cm lange, hängende Zapfen mit Harz überzogen
Tränen-Kiefer	Aussaart	- bis 20 cm lange silberblau-grüne Nadeln, 5-nadelig
	Afghanistan, Nepal	- als Jungbaum stark wachsend, frosthart
Pinaceae	Mai	- Solitär, Parkanlagen - LB: 6.2.1.1 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Sequoiadendron giganteum	frisch-feucht, tiefgr., humos	- als Jungbaum starkwachsend, dichter kegelförm. Wuchs
Mammutbaum	Aussaart	- dicke Borke schützt Stamm bei Waldbränden
	USA, Kalifornien	- empfindlich auf Sommertrockenheit
Taxodiaceae	April-Mai	- Parkanlagen, Solitär - LB: 7.4.2.1 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'	frisch-feucht, kalkliebend	- Heckenpflanze oder Solitär
Säulen-Eibe	Stecklinge	- frosthart, robust, schnittverträglich
	Cultivar	- sämtliche Pflanzenteile ausser Fruchtfleisch sind giftig
Taxaceae	März	- bevorzugt. Geschützte Lagen mit genügend Luftfeuchtigkeit - LB: 9.3.2.4 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Taxus baccata 'Repandens'	frisch-feucht, kalkliebend	- ganze stark giftig, ausser Fruchtfleisch
Kissen-Eibe	Stecklinge	- niederliegender Wuchs
	Kulturform	- empfindlich auf Trockenheit, Bodenversalzung
Taxaceae	März-April	- Bodendecker, Vorgärten - LB: 9.3.6.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Tsuga canadensis	frisch-feucht, sandig-humos	- locker im Wuchs, Zweigspitzen überhängend
Kanadische Hemlocktanne	Aussaart	- nicht für heisse Lagen, empfindlich auf Sommerhitze
	Nordamerika	- Bodentrockenheit, Streusalz
Pinaceae	Mai	- Solitär, Parkbaum - LB: 7.2.6.2 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Immergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Berberis candidula	frisch-feucht, anspruchslos	- kompakter, breitkugeliger Wuchs
Kissen-Berberitze	Stecklinge, Aussaat	- Kleingarten, Formhecke
	Nordostasien	- Böschungsbefestigung, Baumscheibenbepflanzung
Berberidaceae	Mai	- LB: 7.1.5.6 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Buxus sempervirens 'Rotundifolia'	frisch, kalkliebend	- auffällig runde Blattform
Buchs, Buchsbaum	Stecklinge	- Tendenz zu verkahlen; durch häufigen Schnitt wird eine kompaktere Wuchsform erreicht
	Kulturform	- Parkanlagen, Sichtschutzgehölz, Formhecke
Buxaceae	März-April	- LB: 9.1.4.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold'	frisch-feucht, sauer-alkalisch	- Kletterpflanze, kletternder Strauch
Spindelstrauch	Stecklinge	- wenig anspruchsvoller Bodendecker
	Kulturform	- anfällig auf Dickmaulrüssler
Celastraceae	Juni-Juli	- Bodendecker, Vorgärten, Tröge im Halbschatten
		- LB: 9.3.6.7 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Hedera helix Arborescent-Gruppe	frisch-feucht, nährstoffreich	- wertvoller, immergrüner Herbstblüher
Strauch-Efeu	Stecklinge, Veredlung	- schwarze Früchte im März-April
	Kulturform (Altersform H. helix)	- in Gruppen, als Schnittgrün
Araliaceae	September-Oktober	- LB: 3.1.5.6 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Hypericum 'Hidcote'	frisch-feucht, humos	- grosse, auffällige Blüten
Johannisstrauch	Stecklinge	- Gruppen, Rabatten, Parkanlagen
	Kulturform	- wintergrün - immergrün
Clusiaceae	Juli-Oktober	- Rückschnitt im Frühjahr
		- LB: 6.3.4.6 (Steppengehölze und Trockenwälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Immergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Ilex aquifolium 'Golden van Tol' Buntblättrige Stechpalme Aquifoliaceae	frisch-feucht, humos Stecklinge Kulturform Mai-Juni	- reich fruchtend, Beeren rot - Blätter goldgelb umrandet, kaum bedornt - erträgt Tropfenfall - Unterpflanzung, Rabatten, auch Solitär - LB: 9.2.5.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Ilex crenata 'Convexa' Japanische Stechpalme, Löffel-Ilex Aquifoliaceae	frisch-feucht, sandig-humos Stecklinge Kulturform (Ursprung Japan) Mai-Juni	- löffelartig nach oben gewölbte, kleine Blätter - nicht für trockene Lagen, braucht hohe Luftfeuchtigkeit - Solitär, Gruppen, kleine Formhecken, Buchs-Ersatz - Früchte (Beeren) schwarz - LB: 9.2.6.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Kalmia latifolia Berglorbeer, Kalmie Ericaceae	frisch, sauer humos Absenker, Aussaat östl. USA Mai-Juni	- breit-aufrechter Strauch - Moorbeet, Heidegarten, Solitär - Begleitpflanze zu Rhododendren - LB: 5.2.4.6 (Heiden und Dünen)
Ligustrum ovalifolium Japanischer Liguster Oleaceae	frisch-feucht, sandig-lehmig Steckhölzer, Stecklinge Japan Juni-Juli	- Blätter grösser, breiter als bei L.vulgare - Blattfall bei starken Frösten - v.a. als Heckenpflanze - blauschwarz glänzende, runde Früchte - LB: 6.3.4.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Lonicera pileata Lonizera, Kriech-Heckenkirsche Caprifoliaceae	frisch-feucht, sauer-kalkhaltig Stecklinge China Mai	- Frucht leuchtend violett - Bodendecker oder kleine geschnittene Hecke - Böschungen, Dachgärten - LB: 7.1.6.6 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Immergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Magnolia grandiflora	frisch-feucht, humos, l. sauer	- nur für milde, geschützte Lagen (Seelagen)
Immergrüne Magnolie	Aussaart, Stecklinge	- Solitär, Parkanlagen
	USA; Südstaaten	- LB: 3.2.1.3 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Magnoliaceae	Juni-August	
Mahonia aquifolium	trocken-frisch, sandig-humos	- gut Schnittverträglich
Mahonie	Aussaart, Absenker, (Steckling)	- Rabatten, Unterbepflanzung, Flächenbegrünung
	Nordostasien	- gelbes Holz, gelbe Wurzeln
Berberidaceae	April-Mai	- dunkelblau bereifte Beeren
		- LB: 7.2.5.6 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Osmanthus heterophyllus	frisch-feucht, humos, nahrhaft	- bedornete und ganzrandige Blätter (heterophyllus)
Duftblüte	Stecklinge, Veredlung	- dichter, verzweigter Wuchs, intensiv duftende Blüten
	Japan, Taiwan	- Frostschutz bei Jungpflanzen
Oleaceae	September-Oktober	- Solitär, Rabatten, Formhecken, Sichtschutzgehölz
		- LB: 6.3.4.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Osmanthus x burkwoodii	frisch-feucht, humos, nahrhaft	- breiter, lockerer Wuchs
Burkwoods Duftblüte	Stecklinge	- kleine, lanzettlich-ovale, gesägte Blätter
Osmarea burkwoodii	Kulturform	- attraktiver Blütenduft
Oleaceae	April-Mai	- Rabatten, Kleingärten, Tröge, Buchs-Ersatzpflanze
		- LB: 6.3.4.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Photinia x fraseri 'Red Robin'	frisch-feucht, nährstoffreich	- Blattaustrieb leuchtend rot
Glanzmispel	Stecklinge	- Blatt verkehrt eiförmig, ledrig
	Kulturform	- Rabatten, Formhecken, Kübel, Tröge, Sichtschutzgehölz
Rosaceae	Mai	- nicht feuerbrandanfällig (Ersatzpfl. für hohe Cotoneaster)
		- LB: 3.2.5.4 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Immergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Pieris 'Forest Flame'	frisch-feucht, sauer	- Blattaustrieb leuchtend rot
Japanische Lavendelheide	Stecklinge	- unregelmässig, breit wachsend
Pieris japonica 'Forest Flame'	Kulturform	- hängende Blütenrispen
Ericaceae	April-Mai	- Moorbeetpflanze
		- LB: 7.2.4.6 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	frisch-feucht, humos	- eher schwachwachsend, kompakter Wuchs, breitwüchsig
Kirschlorbeer	Stecklinge	- gut schnittverträglich
	Kulturform	- invasiver Neophyt (Schwarze Liste)
Rosaceae	Mai-Juni	- LB: 3.1.5.5 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Prunus lusitanica 'Angustifolia'	frisch, humos	- vor Wintersonne schützen, Junpflanzen frostempfindlich
Portugiesische Lorbeer-Kirsche	Stecklinge	- dicht-buschiger Wuchs
	Kulturform (Art von Südwesteuropa)	- Deckstrauch, Formhecken
Rosaceae	Juni	- LB: 6.2.2.4 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Rhododendron ferrugineum	frisch-feucht, sauer, humos	- einheimischer Strauch des Gebirges
Rostblättrige Alpenrose	Stecklinge, Aussaat	- berostete Blattunterseite als Erkennungsmerkmal
	einheimisch	- Winterschutz mit Tannästen
Ericaceae	Mai-Juni	- für Moorbeete, Gräber
		- LB: 8.1.5.6 (Bergwälder und Sträucher alpiner Bereiche)
Viburnum rhytidophyllum	frisch-feucht, sandig-lehmig	- immergrüner Deckstrauch
Runzelblättriger Schneeball	Stecklinge, (Aussaat)	- Frucht zuerst rot dann schwarz
	China	- Haare auf der Blattunterseite können Allergien auslösen
Caprifoliaceae	Mai-Juni	- LB: 6.4.2.4 (Steppengehölze und Trockenwälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Immergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i>	<i>Boden</i>	
<i>Deutscher Name</i>	<i>Vermehrung</i>	
<i>Synonym</i>	<i>Heimat</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
<i>Familie</i>	<i>Blütezeit</i>	
Viburnum tinus	trocken-frisch, kalkliebend	- Vorgarten, Atriumgarten, als Kübelpflanze
Mittelmeer-Schneeball, Lorbeer-Schneeball	Stecklinge	- geschützter Standort (bedingt winterhart)
	Europa	- LB: 6.1.4.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Caprifoliaceae	November-April	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Klettergehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Aristolochia macrophylla	frisch-feucht, nährstoffreich	- starkwüchsig
Pfeifenwinde	Aussaart, Ableger	- Windschutz, Pergola, Wandbegrünung
Aristolochia durior	Nordamerika	- zur raschen Begrünung von Gerüsten oder Fassaden
Aristolochiaceae	Mai-Juni	- LB: 2.4.6.9 (Auen- und Ufergehölze)
Clematis Cultivars	frisch-feucht, humos	- verlangt kühlen, schattigen "Fuss"
Clematis, Waldrebe	Stecklinge, Veredlung	- sehr viele Sorten
Clematis-Hybriden	Kulturform	- Krankheit Clematiswelke v.a. bei verdichtetem Boden
Ranunculaceae	Juni-September	- LB: 9.3.2.9 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Fallopia baldschuanica	frisch-feucht, sauer-kalkhaltig	- schnellwachsend
Schling-Flügelknöterich	Steckholz	- gut frosthart
Fallopia aubertii	N-/O-Asien	- LB: 7.3.2.9 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Polygonaceae	August-Oktober	
Parthenocissus quinquefolia	frisch-feucht, nährstoffreich	- Herbstfarbe scharlachrot, Frucht blauschwarz
Fünffingrige Jungfernrebe	Steckholz (Sorten werden veredelt)	- benötigt bedingt Kletterhilfe (Ranker und Selbstklimmer)
	Nordamerika	- bildet Haftscheiben (oft P. inserta ohne Haftscheiben im Handel)
Vitaceae	Juli-August	- LB: 2.4.3.9 (Auen- und Ufergehölze)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Abelia x grandiflora	frisch, schwach sauer	- Herbstfärbung rot
Abelie	Stecklinge	- geschnittene und ungeschnittene Blütenhecken
	Züchtung	- für Tröge geeignet
Caprifoliaceae	Juli-Oktober	- LB: 6.3.4.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Acer japonicum 'Aconitifolium'	frisch-feucht, sandig-humos	- Solitär, für Tröge
Japanischer Ahorn	Veredlung	- empfindlich gegen Kalk, Nässe und Bodenverdichtung
	Japan	- nicht schnittverträglich
Aceraceae	April-Mai	- Herbstfärbung orangerot
		- LB: 7.2.2.4 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Acer negundo	frisch-feucht, humos	- Solitärgehölz, oft mehrstämmig, zweihäusig
Eschen-Ahorn	Aussaat, Sorten Veredlung	- rasche Jugendwachstum, frosthart, hitzeverträglich
	Nordamerika	- im Alter windbrüchig
Aceraceae	März-April	- weiss-grüne und rosa-weiss-grüne Sorten im Handel
		- LB: 2.4.3.2 (Auen- und Ufergehölze)
Acer palmatum 'Dissectum'	feucht, sandig-humos	- Herbstfärbung goldgelb
Schlitz-Ahorn	Veredlung	- Dachgärten, Steingärten, Tröge, Friedhöfe
	Cultivars (Japan)	- LB: 7.2.2.5 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Aceraceae	Mai-Juni	
Acer platanoides	frisch-feucht, keine Staunässe	- rotlaubige Sorten, Kugelform ('Globosum')
Spitz-Ahorn	Aussaat, Sorten Veredlung	- mehltauanfällig (Spätsommer)
	einheimisch, Europa, Kleinasien	- Park- Alleebaum
Aceraceae	April	- Herbstfärbung goldgelb
		- LB: 3.1.3.1 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn	frisch-feucht, kalkliebend Aussaart, Sorten Veredelung einheimisch, Europa	- Solitär, Parkbaum - sehr frosthart - LB: 7.3.3.1 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Aceraceae	Mai-Juni	
Acer saccharinum Silber-Ahorn	frisch-feucht, nährstoffreich Aussaart Nordamerika	- Solitär, zweihäusig - schnell wachsend, Äste locker, überhängend - bruchgefährdet - Herbstfärbung goldorange - LB: 2.3.3.1 (Auen- und Ufergehölze)
Aceraceae	März	
Acer shirasawanum 'Aureum' Japanischer Gold-Ahorn A. japonicum 'Aureum'	frisch, sandig-humos Veredlung Japan	- goldgelbes Laub, Herbstfärbung scharlachrot - benötigt hohe Luftfeuchtigkeit, windempfindlich - nicht schnittverträglich, keine Staunässe - Heidegarten, japanische Gärten, Solitär - LB: 7.2.2.4 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Aceraceae	Mai-Juni	
Aesculus hippocastanum Rosskastanie	frisch-feucht, nährstoffreich Aussaart, Veredlung bei Sorten eingebürgert / Balkan, Bulgarien	- Solitärbaum, Parkbaum; Früchte nicht geniessbar - Kastanienminiermotte und Pilzbefall führt zu braunen Blättern und Blattfall - Sorte `Baumannii` weisse, gefüllte Blüten - keine Früchte - LB: 7.3.2.1 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Hippocastanaceae	Mai-Juni	
Aesculus parviflora Strauch-Rosskastanie	frisch-feucht, tiefgründig Anhäufeln, Wurzelschnittlinge südöstl. Nordamerika	- Grossstrauch breiter als hoch (Solitär) - ausläufertreibend - etwas wärmeliebend, stadtklimafest - Herbstfärbung gelb - LB: 2.3.5.4 (Auen- und Ufergehölze)
Hippocastanaceae	Juli-August	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Aesculus x carnea 'Briotii' Rotblühende Rosskastanie Hippocastanaceae	frisch-feucht, tiefgründig Veredlung Züchtung Mai-Juni	- Alleebaum kleinkronig - kaum Früchte (giftig) - Herbstfärbung gelb - LB: 3.3.3.3 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Alnus glutinosa Schwarz-Erle Betulaceae	feucht-nass (Sumpf), kalkarm Aussaart einheimisch, Europa-Asien März-April	- zapfenartige, kleine Früchte - Pioniergehölz, auch für Berglagen - erträgt Überschwemmungen - Auengehölz, für Bachläufe, zur Uferbefestigung - LB: 1.2.2.2 (Moor- und Sumpfhölzer)
Amelanchier rotundifolia Gewöhnliche Felsenbirne A. ovalis Rosaceae	frisch, schwach sauer Ausläufer, Aussaat einheimisch, Europa April-Mai	- treibt Ausläufer - Austrieb zimtfarben, Herbstfärbung rot - Früchte essbar, rotschwarz - Wildhecken, Pioniergehölz auch für Berglagen - LB: 6.3.3.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Aronia melanocarpa Kahle Apfelbeere Rosaceae	frisch-feucht, sauer, sumpfig Aussaart, evtl. Anhäufeln Nordamerika Mai-Juni	- essbare schwarze Früchte für Konfitüre und Saft - Herbstfärbung orange - Innenhof, Gehölz-Unterpflanzung - LB: 4.2.2.5 (Artenarme Wälder und Gehölzgruppen)
Betula utilis var. jacquemontii Himalaya-Birke Betulaceae	frisch-feucht, schwach sauer Veredlung, Stecklinge Nepal, Himalaya Mai-Juli	- Herbstfärbung goldgelb - weisse Rinde, abrollend - LB: 7.2.3.2 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Buddleja davidii 'Black Knight' Schmetterlingstrauch, Sommerflieder	trocken-frisch, kalkliebend Steckholz, Stecklinge China	- zieht Schmetterlinge an / Schmetterlingsweide - instabiles Holz; Rückschnitt im Frühjahr - invasive Pflanze, daher Abgeblühtes wegschneiden - verträgt Trockenheit - LB: 9.1.1.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Buddlejaceae	Juli-September	
Callicarpa bodinieri var. giraldii Schönfrucht	frisch-feucht, sandig, humos Stecklinge, Aussaat China	- Tröge, Dachgärten - violette Beeren (giftig) ab Oktober - gelbe Herbstfärbung - LB: 9.2.5.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Verbenaceae	Juli-August	
Carpinus betulus 'Fastigiata' Pyramiden-Hainbuche	trocken-frisch, anspruchslos Veredelung Kulturform (Art einheimisch)	- Herbstfärbung gelb - Wuchs kegel- bis eiförmig - erträgt Stadtklima gut - Solitär, Alleebaum, Gruppen - LB: 3.1.4.3 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Betulaceae	April-Mai	
Castanea sativa Edel-Kastanie, Ess-Kastanie, Marone	trocken-frisch, sauer-neutral Aussaat, Fruchtsorten durch Veredelung Alpensüdseite, Südeuropa	- wärmeliebend, industriefest, hitzeverträglich - Nutzpflanze (Früchte, Holz für Pergolen usw.) - Solitär, Parkbaum, Alleebaum - für Floristik verwendet - LB: 6.2.2.1 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Fagaceae	Juni	
Catalpa bignonioides Trompetenbaum	frisch-feucht, nährstoffreich Aussaat Nordamerika	- grosse auffällige Blätter, lange, braune Schoten - Herbstfärbung gelb - LB: 2.4.1.3 (Auen- und Ufergehölze)
Bignoniaceae	Juni-Juli	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles'	trocken-frisch, kalkliebend	- warme Lagen und leichte Böden bevorzugt
Säckelblume	Steckling	- geschnittene Hecken, Solitär
	Züchtung	- starker Rückschnitt im Frühjahr fördert Blütenbildung
Rhamnaceae	Juli-Oktober	- LB: 9.1.1.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Cercidiphyllum japonicum	frisch-feucht, nährstoffreich	- oft mehrstämmig, malerischer Wuchs
Kuchenbaum, Katsurabaum	Stecklinge	- Laub duftet im Herbst nach Lebkuchen, gegenständig
	China, Japan	- Herbstfärbung gelb
Cercidiphyllaceae	April	- bei Trockenheit wässern, etwas spätfrostempfindlich
		- LB: 2.3.2.3 (Auen- und Ufergehölze)
Cercis siliquastrum	trocken-frisch, kalkliebend	- Solitär
Judasbaum	Aussaat	- blüht am alten Holz vor/mit dem Blattaustrieb
	Südeuropa	- frostempfindlich (geschützte, warme Lagen)
Caesalpiniaceae	April-Mai	- Herbstfärbung gelb
		- LB: 6.1.1.4 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Cornus alba 'Sibirica'	frisch-feucht, nährstoffreich	- Rinde korallenrot (besonders im Winter attraktiv)
Hartriegel	Steckholz	- kann jährlich verjüngt werden (starker Rückschnitt)
	Osteuropa-Sibirien, Korea, Japan	- frosthart, kalkverträglich
Cornaceae	Mai-Juni	- Herbstfärbung rot
		- LB: 9.3.3.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Cornus controversa	frisch-feucht, leicht sauer	- dekorativer etagenförmiger Wuchs
Etagen-Hartriegel, Pagoden-Hartriegel	Aussaat, Stecklinge	- Herbstfärbung purpurrot
	China, Korea, Japan	- guter Gartenboden
Cornaceae	Juli-August	- LB: 3.2.4.3 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Cornus kousa	frisch-feucht, leicht sauer	- Herbstfärbung scharlachrot
Japanischer Blumen-Hartriegel	Aussaat, Veredlung bei Sorten	- weisse Hochblätter (Scheinblüten)
	Japan, Korea	- Früchte rot, essbar
Cornaceae	Mai-Juni	- LB: 2.3.5.4 (Auen- und Ufergehölze)
Cornus mas	trocken-frisch, sandig-lehmig	- Früchte essbar, für Konfitüre, Säfte
Tierlibaum, Kornelkirsche	Aussaat	- Blüte vor Laubaustrieb, Herbstfärbung rot
	einheimisch, Europa-Westasien	- trockenverträglich
Cornaceae	März	- Wildhecken, Solitär, Formhecken
		- LB: 6.3.3.4 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Cornus sericea 'Flaviramea'	frisch-feucht, sauer-neutral	- bildet Wurzelausläufer und Ableger
Gelbholz-Hartriegel	Steckholz, Stecklinge	- gelbes Holz (besonders im Winter attraktiv)
Cornus stolonifera 'Flaviramea'	Nordamerika	- kann jährlich verjüngt werden
Cornaceae	Mai-Juni	- LB: 2.1.4.5 (Auen- und Ufergehölze)
Corylopsis pauciflora	frisch-feucht, sandig-humos	- blüht vor Blattaustrieb in hängenden Trauben
Scheinhasel	Ableger	- spätfrostgefährdet
	Japan, Taiwan	- Tröge, Dachgärten, Steingärten, Friedhof
Hamamelidaceae	März-April	- Herbstfärbung gelb
		- LB: 7.2.4.5 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Corylopsis spicata	frisch-feucht, durchlässig	- sparriger Wuchs
Hohe Scheinhasel	Ableger, Stecklinge	- Herbstfärbung gelb
	Japan	- blüht vor/mit Blattaustrieb
Hamamelidaceae	April-Mai	- LB: 7.2.4.6 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Corylus avellana 'Contorta' Korkenzieher-Hasel	frisch, Anhäufeln, (Veredlung) Züchtung; 1863 in England gefunden	- Herbstfärbung gelb - korkenzieherartig gedrehte Zweige - Wildlinge entfernen bei veredelten Pflanzen (abreißen) - Solitär, grosse Dachgärten, Floristik an Ostern - LB: 3.1.3.5 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Betulaceae	Februar-April	
Cotinus coggygia 'Royal Purple' Purpurroter Perückenstrauch	trocken-frisch, kalkliebend Stecklinge Südeuropa-China	- Laub rotviolett, Herbstfärbung orangerot-weinrot - sehr trockenverträglich - Holz gelb, starker Geruch - Solitär, Gruppen, Floristik - LB: 9.1.1.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Anacardiaceae	Juni-Juli	
Crataegus x lavalleyi Lederblättriger Weissdorn, Apfeldorn	trocken-frisch, Steckling Kreuzung	- apfelartige orange Früchte - Herbstfärbung orange - Strassenbaum, innerstädtische Begrünung - mittel anfällig auf Feuerbrand - LB: 6.3.3.3 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Rosaceae	Mai-Juni	
Cytisus scoparius Besenginster	trocken-frisch, nährstoffarm Aussaat, Stecklinge einheimisch, Europa	- Tröge, Stein- und Heidegärten, Dachgärten - auch zweifarbige Sorten (gelb-rot) - kantiges Holz (für Besen verwendet), Assimilationsspross - kurze Lebensdauer (12-15 Jahre) - LB: 4.1.1.5 (Artenarme Wälder und Gehölzgruppen)
Fabaceae	Mai-Juni	
Daphne mezereum Seidelbast, Gewöhnlicher Seidelbast	frisch-feucht, humos Aussaat einheimisch, Europa-Kleinasien	- stark giftig - hohe Standortansprüche - Solitär in Kleingärten, Vorgärten - blüht vor Blattaustrieb - LB: 3.3.6.6 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Thymelaeaceae	März-April	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Deutzia gracilis	frisch-feucht, nährstoffreich	- grosse weisse Rispen
Zierliche Deutzie	Steckling	- aufrechter Wuchs, kann als Hecke geschnitten werden
	Japan	- anspruchslos, frosthart, reichblühend
		- LB: 7.2.2.6 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Hydrangeaceae	Mai-Juni	
Elaeagnus angustifolia	trocken-frisch, kalkliebend	- trockenheits- und salzresistent, sehr frosthart
Schmalblättrige Ölweide	Aussaat	- Belaubung silbrig, Austrieb weissfilzig
	West- und Mittelasien	- Windschutz- und Schattengehölz
		- LB: 6.1.2.4 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Elaeagnaceae	Mai-Juni	
Euonymus alatus	frisch-feucht, nährstoffreich	- anspruchslos, frosthart, gleich breit wie hoch
Flügel-Spindelstrauch	Aussaat	- Herbstfärbung leuchtend rot
	Ostasien	- Zweige mit extremen Korkleisten
		- Tröge, Solitär, Dachgarten
		- LB: 3.1.6.5 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Celastraceae	Mai-Juni	
Euonymus europaeus	frisch-feucht, nährstoffreich	- einheimisch
Gewöhnliches Pfaffenhütchen	Aussaat	- orange-rote Früchte
	einheimisch, Europa	- Herbstfärbung gelb-orange
		- Wildhecken, Floristik, Solitär
		- LB: 2.4.6.4 (Auen- und Ufergehölze)
Celastraceae	Mai	
Exochorda racemosa	frisch-feucht, nährstoffreich	- Früchte sternförmig, fünfteilig, langhaftend (bis 1 Jahr)
Prunkspiere	Steckling	- durch Einkürzen der verblühten Triebe wird eine bessere Strauchform erreicht
	N-China	- LB: 3.2.2.4 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Rosaceae	Mai	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Ficus carica Echte Feige, Feigenbaum	trocken-frisch, nährstoffreich Steckholz, (Veredlung) Süd-Europa, Kleinasien, Nordafrika	- Kübelpflanze oder an geschützten Lagen ausgepflanzt - Früchte essbar - blüht dreimal pro Jahr; März, Juni, September - LB: 6.4.1.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Moraceae	März	
Fothergilla major Grosser Federbuschstrauch	frisch-feucht, leicht sauer Stecklinge, Absenker Südöstliches Nordamerika	- Herbstfärbung feurig gelbrot - Blütenform wie Flaschenbürsten - sandig-humoser Boden - Solitär, Friedhof, Blüten-, Duftstrauch - LB: 4.1.2.5 (Artenarme Wälder und Gehölzgruppen)
Hamamelidaceae	Mai	
Fraxinus excelsior Esche	frisch-feucht, nährstoffreich Aussaart einheimisch, Europa	- Pioniergehölz, Herbstfärbung gelb - Strassen-, Alleebaum, Solitär, Parks - tiefgründige Böden - anfällig auf Eschentriebsterben (Eschenwelke) - LB: 2.4.2.1 (Auen- und Ufergehölze)
Oleaceae	April-Mai	
Fraxinus ornus Blumen-Esche, Manna-Esche	frisch, sandig-lehmig Aussaart, Veredlung bei Sorten Südeuropa-Kaukasus	- Baum oder Strauch - kleinkroniger Alleebaum, Blütenbaum - kugelförmige Sorten ('Meczek') - Solitär, Atriumgärten - LB: 6.3.1.3 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Oleaceae	Mai-Juni	
Fuchsia magellanica var. gracilis Freiland-Fuchsia	frisch-feucht, sandig-humos Steckling Mexico	- strauch- oder halbstrauchartig - Rückschnitt im Frühling - Solitär, Tröge, Friedhof, Staudenanlagen, Terrasse - LB: 9.2.5.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Onagraceae	Juli-Oktober	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Genista lydia	trocken-frisch, kalkliebend	- nährstoffarme Böden
Lydischer Ginster, Stein-Ginster	Stecklinge, Aussaat	- Tröge, Steingärten, Felssteppen
	Balkan, Türkei, Syrien	- LB: 6.1.1.7 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Fabaceae	Mai-Juni	
Gleditsia triacanthos	frisch, nährstoffreich	- Fruchtschoten 25-40 cm lang, braunrot
Christusdorn, Gleditschie	Aussaat, Veredlung bei Sorten	- Herbstfärbung gelb
	USA	- Dornen bis 30 cm lang, dornlose Sorten im Handel
Caesalpiniaceae	Juni-Juli	- stadtklimaresistent, Alleebaum
		- LB: 2.5.1.1 (Auen- und Ufergehölze)
Hippophae rhamnoides	trocken-frisch, nährstoffarm	- zweihäusig; immer ein weibl. und ein männl. Expl. setzen
Sanddorn	Aussaat, Steckholz	- Beeren orange, essbar, reich an Vitamin C
	einheimisch, Europa	- treibt Ausläufer
Fabaceae	April	- auf allen Pflanzenteilen mit Öldrüsen besetzt (Schülfern)
		- LB: 5.1.2.4 (Heiden und Dünen)
Hydrangea anomala subsp. petiolaris	frisch-feucht, sandig-humos	- Kletterpflanze (Haftwurzeln)
Kletter-Hortensie	Absenker, Anhäufeln	- auch freistehend oder als Bodendecker
	Korea, Japan, Taiwan	- Herbstfärbung gelb
Hydrangeaceae	Juni-August	- LB: 7.2.6.9 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Hydrangea aspera subsp. sargentiana	frisch-feucht, leicht sauer	- grosse, stark behaarte Blätter
Samt-Hortensie	Stecklinge	- Solitär, im Unterholz, in Gruppen
	China	- LB: 3.1.5.5 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Hydrangeaceae	Juli-August	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	frisch-feucht, sandig-humos	- für Einzelstellung, Blütenhecken, Trockenbinderei
Rispen-Hortensie	Stecklinge	- imposante Blütenrispen, beim Abblühen rosa
	Kulturform (Art aus Japan, China)	- im Sommer hoher Wasserbedarf
		- LB: 2.1.5.5 (Auen- und Ufergehölze)
Hydrangeaceae	Juli-September	
Hydrangea quercifolia	frisch, schwach sauer	- Herbstfärbung feuerrot
Eichenblättrige Hortensie	Stecklinge	- LB: 6.3.2.6 (Steppengehölze und Trockenwälder)
	Nordamerika	
Hydrangeaceae	Juli-September	
Kerria japonica 'Pleniflora'	frisch-feucht, nährstoffreich	- treibt stark Ausläufer
Kerrie, Ranunkelstrauch	Stecklinge, Teilung	- Blütenhecke, Gruppengehölz
	West-, Zentralchina	- Total-Rückschnitt möglich
		- LB: 9.3.2.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Rosaceae	April-Mai	
Koelreuteria paniculata	trocken-frisch, kalkliebend	- Herbstfärbung gelb
Blasenbaum	Aussaat, Wurzelschnittlinge, Ableger	- blasige, kupferfarbige Früchte
	China, Korea, Japan	- kleinkroniger Alleebaum
		- LB: 6.1.1.4 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Sapindaceae	Juli-September	
Kolkwitzia amabilis	frisch-feucht, nährstoffreich	- Wuchs überhängend
Kolkwitzie	Aussaat, Stecklinge	- Rinde abrollend
	China	- LB: 3.1.3.5 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Caprifoliaceae	Juni	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Laburnum x watereri 'Vossii'	frisch-feucht, nährstoffreich	- Blütentrauben bis 50 cm lang
Goldregen	Veredlung, Steckholz	- glatte grüne Rinde
	Züchtung	- stark giftig; Vorsicht bei Samenständen
Fabaceae	Mai-Juni	- LB: 9.3.2.3 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Lespedeza thunbergii	frisch, leicht sauer	- Tröge und Böschungen
Buschkiee	Teilung, Stecklinge, Absenker	- Rückschnitt im Frühling
	Japan, Nord-China	- Dachgarten, Mauerkronen
Fabaceae	Juli-Oktober	- LB: 6.2.1.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Liquidambar styraciflua	frisch-feucht, nährstoffreich	- Herbstfärbung gelb bis violett
Amberbaum	Aussaat, Absenker	- Korkleisten
	Nordamerika, Lateinamerika	- kugelig-verholzte, stachelige Früchte
Hamamelidaceae	April-Mai	- LB: 2.3.1.2 (Auen- und Ufergehölze)
Liriodendron tulipifera	frisch-feucht, nährstoffreich	- Herbstfärbung goldgelb
Tulpenbaum	Aussaat, Absenker	- Baum für Einzelstellung, Park, grosse Gärten
	Nordamerika	- Alle Pflanzenteile giftig
Magnoliaceae	Juni	- LB: 2.3.2.1 (Auen- und Ufergehölze)
Lonicera x purpusii	trocken-frisch, anspruchslos	- wintergrün
Duft-Heckenkirsche	Steckholz (Stecklinge)	- rote Früchte, meist zu zweit verwachsen
	Kreuzung	- wichtige Winter-Duftpflanze (intensiver angenehmer Duft)
Caprifoliaceae	Februar-März	- LB: 6.3.1.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Lonicera xylosteum	frisch,	- rote Früchte, meist zu zweit verwachsen
Heckenkirsche, Rote Heckenkirsche	Aussaart, Steckholz, (Stecklinge)	- Wildhecke, geschnittene Hecken
	einheimisch	- Ingenieurbiologie, Böschungsbefestigung
Caprifoliaceae	Mai-Juni	- LB: 3.1.6.5 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Magnolia x soulangeana	frisch-feucht, sauer-neutral	- gut frosthart
Tulpen-Magnolie	Veredlung, Stecklinge, Ableger	- besonders weisse Sorten sind regenempfindlich
	Kreuzung	- Solitär, Parkanlagen
Magnoliaceae	April	- LB: 9.2.1.4 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Malus floribunda	frisch-feucht,	- erbsengrosse gelbe Früchte
Zier-Apfel	Veredlung	- Bauerngärten, Solitär, kleinkroniger Alleebaum
	Ostasien	- schirmförmig oder breit ausladend
Rosaceae	Mai	- LB: 3.3.4.3 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Nothofagus antarctica	frisch-feucht, sauer-neutral	- mässiger süsslicher Blütenduft
Scheinbuche	Aussaart, Absenker	- Herbstfärbung goldgelb
	Lateinamerika	- Solitär, Dachgärten
Fagaceae	Mai	- dekorative Rinde
		- LB: 7.2.1.4 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Paeonia x suffruticosa	trocken-frisch, humos	- gefüllte oder einfach blühende Sorten, Heilpflanze
Strauch-Pfingstrose	Veredlung, Aussaat, Teilung	- vor Spätfrost schützen
	Kreuzung	- nährstoffarme Böden
Paeoniaceae	Mai	- Staudenrabatten, Solitär, Bauerngärten
		- LB: 6.3.4.6 (Steppengehölze und Trockenwälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Parrotia persica	frisch-feucht, nährstoffreich	- Herbstfarbe gelb bis scharlachrot
Parrotie	Stecklinge, Absenker	- Solitär, Parkanlagen, grosse Gärten
	Nord-Iran (früher Persien)	- kleine rötliche Blüten vor Blattaustrieb
		- LB: 2.3.2.4 (Auen- und Ufergehölze)
Hamamelidaceae	März-April	
Perovskia atriplicifolia	trocken-frisch, nährstoffarm	- graugrünes Laub mit intensivem würzigem Geruch
Silber-Perowskie, Silberstrauch	Teilung, Stecklinge	- wird in Russland als Kräutertabak verwendet
	Afghanistan, Himalaya, Tibet	- Halbstrauch; Rückschnitt im Frühjahr
		- Dachgärten, Heidegärten, Staudenrabatten
Lamiaceae	August-Oktober	- LB: 6.1.1.8 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Philadelphus coronarius	frisch, nährstoffreich	- Auslichten nach 2-3 Jahren nach der Blüte
Pfeifenstrauch, Zimtröschen	Steckholz	- starker Blütenduft
	Südosteuropa, Italien, Österreich	- Blütenhecken, Solitär
		- LB: 3.1.3.5 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Hydrangeaceae	Mai-Juni	
Philadelphus 'Virginal'	frisch-feucht, nährstoffreich	- Blüten gefüllt, intensiver Blütenduft
Pfeifenstrauch	Steckholz	- Auslichtungsschnitt nach der Blüte
	Kulturform	- Blütenhecken, Solitär, Dachgärten
		- LB: 9.3.4.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Hydrangeaceae	Mai-Juni	
Platanus x hispanica	frisch, kalkliebend	- Rinde blättert plattenförmig ab
Gewöhnliche Platane, Bastard-Platane	Steckholz	- Strassenbaum, Alleebaum, anfällig auf Platanenkrebs
		- kann in Form geschnitten werden (Schirmbaum)
Platanus x acerifolia	Kreuzung	- gelbe Herbstfärbung, hängende igelartige Früchte
		- LB: 2.5.2.1 (Auen- und Ufergehölze)
Platanaceae	Mai	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Populus nigra 'Italica' Säulen-Pappel, Sarbaum	frisch-feucht, nährstoffreich Steckholz Züchtung	- Alleebaum, Parkbaum, Landschaftsgehölz - regelmässiger Schnitt empfohlen, da brüchiges Holz - LB: 2.4.3.1 (Auen- und Ufergehölze)
Salicaceae	April	
Prunus cerasifera 'Woodii' Blut-Pflaume, Kirsch-Pflaume	trocken-frisch, kalkliebend Veredlung	- Laub schwarzrot, glänzende Rinde - Frucht schwarzrot, essbar (Pflaume) - Hecken, Alleebaum, Solitär
Prunus cerasifera 'Nigra'	Kulturform	- LB: 9.3.1.4 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Rosaceae	April	
Prunus padus Trauben-Kirsche	frisch-feucht, Aussaat	- Früchte schwarz, kleine Kirschen in hängenden Trauben - abgekratzte Rinde riecht nach Bittermandeln (Blausäure) - freie Landschaft, Wildhecken
	einheimisch, Europa-Sibirien	- kann von Gespinnstmotten befallen werden
Rosaceae	April-Mai	- LB: 2.2.4.4 (Auen- und Ufergehölze)
Prunus serrulata 'Kanzan' Japanische Zier-Kirsche	frisch-feucht, nährstoffreich Veredlung, Stecklinge	- Alleebaum, japanische Gärten - Solitär für grosse und kleine Gärten - früher oftmals am Kronenansatz veredelt
	Kulturform (Art von N-/O-Asien)	- LB: 9.3.2.4 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Rosaceae	April-Mai	
Quercus robur Stiel-Eiche	frisch-feucht, nährstoffreich Aussaat, (Stecklinge)	- Solitärgehölz oder Alleebaum - Eicheln, früher als Schweinefutter oder Kaffee-Ersatz verwendet - unregelmässiger Wuchs, tief eingerissene Borke
	einheimisch	- LB: 3.1.4.1 (Artenreiche Wälder und Gehölzgruppen)
Fagaceae	April-Mai	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Quercus rubra	trocken-frisch,	- Herbstfärbung tiefrot
Rot-Eiche	Aussaat, (Stecklinge)	- Solitär oder Alleebaum, Ingenieur-Biologie
	Nordamerika	- Parkanlagen, Pioniergehölz
Fagaceae	April-Mai	- Eicheln mit kurzer Kappe
		- LB: 4.2.2.1 (Artenarme Wälder und Gehölzgruppen)
Rhamnus cathartica	frisch, sandig-lehmig	- Frucht schwarz, giftig, abführende Wirkung
Kreuzdorn	Aussaat	- Dornen, abrollende Rinde
	Einheimisch	- Heilpflanze
Rhamnaceae	Mai-Juni	- Wildhecken, Böschungsbefestigung, Windschutz
		- LB: 6.3.3.4 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Rhododendron mollis	frisch-feucht, sauer	- Moorbeet
Japanische Azalee	Stecklinge	- rote Herbstfärbung
	Japan	- LB: 9.2.2.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Ericaceae	Mai-Juni	
Rhododendron yakushimanum	frisch-feucht, sauer	- Blattunterseite hellbraun-filzig
Japanischer Rhododendron	Stecklinge	- Moorbeet
	Japan	- LB: 7.2.2.5 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Ericaceae	Mai-Juni	
Ribes alpinum	trocken-frisch, kalkliebend	- kleinere Hecken, Rabatten, Böschungen
Alpen-Johannisbeere	Stecklinge, Aussaat	- Frucht rot
	einheimisch	- LB: 7.1.6.6 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Grossulariaceae	April-Mai	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Ribes sanguineum	frisch-feucht, nährstoffreich	- blühende Hecken, Solitär, Floristik
Blut-Johannisbeere	Stecklinge	- LB: 4.3.2.5 (Artenarme Wälder und Gehölzgruppen)
	Nordamerika	
Grossulariaceae	April-Mai	
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	trocken-frisch, kalkliebend	- dornelos
Kugel-Robinie	Veredelung	- Allee- und Strassenbaum
	Kulturform (Art von Nordamerika)	- Krone wächst von alleine als Kugel
Fabaceae	Juni	- LB: 6.1.3.3 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Rosa canina	trocken-frisch, kalkliebend	- rote Hagebutten als Zierde, Wildobst
Hunds-Rose	Aussaat	- Pioniergehölz
	einheimisch	- LB: 6.3.3.5 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Rosaceae	Juni	
Rosa rugosa	trocken-frisch, sauer-neutral	- in Gruppen, Flächenpflanzung
Kartoffel-Rose	Stecklinge, Teilung	- rote Hagebutten
	N-/O-Asien	- sehr robust und winterhart
Rosaceae	Juni-September	- LB: 5.2.3.5 (Heiden und Dünen)
Salix daphnoides	frisch-feucht, wenig Ansprüche	- blau bereifte Zweige
Reif-Weide	Stecklinge	- für Uferbefestigung und Böschungen
	Einheimisch	- Herbstfärbung gelb
Salicaceae	März-April	- LB: 2.2.4.3 (Auen- und Ufergehölze)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Salix purpurea 'Nana' Zwerg-Purpur-Weide Salicaceae	frisch-feucht, Stecklinge Kulturform (Art einheimisch) März-April	- feinzweigig, kugeliger Wuchs, schnittverträglich - hitze- und windverträglich - für Tröge und Böschungen - LB: 9.3.3.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Sambucus racemosa Roter Holunder Caprifoliaceae	frisch-feucht, sauer-neutral Aussaart, Steckholz einheimisch April-Mai	- Wuchs breit aufrecht, überhängend - Frucht scharlachrot - LB: 7.2.3.4 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Sophora japonica Schnurbaum Fabaceae	trocken-frisch, kalkliebend Aussaart China, Korea August	- liebt warme Lagen, verträgt Stadtklima - Solitär, Alleebaum - Schoten haften bis in den Winter - Herbstfärbung gelb - LB: 6.1.2.2 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Sorbus aria Mehlbeere Rosaceae	frisch, schwach sauer Aussaart einheimisch Mai-Juni	- Frucht rot - Herbstfärbung gelb - Blattunterseite silbrig-weiss - feuerbrandanfällig - LB: 6.3.3.3 (Steppengehölze und Trockenwälder)
Sorbus aucuparia Vogelbeere, Eberesche Rosaceae	frisch, kalkliebend Aussaart einheimisch Mai-Juni	- kleinkroniger Baum, für Wildhecken, Solitär, - Frucht rot - Herbstfarbe orangerot - feuerbrandanfällig - LB: 7.1.3.3 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i> <i>Deutscher Name</i> <i>Synonym</i> <i>Familie</i>	<i>Boden</i> <i>Vermehrung</i> <i>Heimat</i> <i>Blütezeit</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
Spiraea japonica 'Little Princess'	frisch-feucht, nährstoffreich	- für Tröge, Kleingärten
Rosa Zwerg-Spierstrauch	Steckholz, Stecklinge	- dichter, kompakter Wuchs
	Kulturform (Art von China, Japan)	- LB: 9.3.3.7 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Rosaceae	Juni-Juli	
Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	frisch-feucht, sauer-neutral	- Rabatten, Böschungen, Hecke
Spierstrauch, Aschgrauer Spierstrauch	Stecklinge, Steckholz	- LB: 9.2.3.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
	Kulturform	
Rosaceae	April-Mai	
Spiraea x vanhouttei	frisch-feucht, nährstoffreich	- Blütenhecke, geschnittene Hecke
Spierstrauch, Belgischer Spierstrauch	Stecklinge, Steckholz	- Solitär, Floristik
	Kulturform	- LB: 9.3.4.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Rosaceae	Mai-Juni	
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	frisch-feucht, nährstoffreich	- Frucht rot (Beeren)
Schneebeere	Steckholz	- Böschungsbefestigung, Bodendecker
	Züchtung	- LB: 9.3.4.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Caprifoliaceae	Juni-Juli	
Syringa meyeri 'Palibin'	frisch-feucht, nährstoffreich	- Tröge, Kleingarten, Steingärten
Zwerg-Flieder	Veredlung	- LB: 9.1.3.6 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
	Kulturform (Art von Nord-China)	
Oleaceae	Mai	

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart) Deutscher Name Synonym Familie	Boden Vermehrung Heimat Blütezeit	Verwendung/Besonderes
Syringa x swegiflexa	frisch-feucht, nährstoffreich	- geschützter, warmer und sonniger Standort
Perlen-Flieder	Veredlung	- Park, Böschungen
	Kreuzung	- LB: 9.2.2.4 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Oleaceae	Juni-Juli	
Tilia platyphyllos	frisch-feucht, sauer-alkalisch	- Strassen- und Solitärbaum
Sommer-Linde	Aussaat	- Herbstfärbung gelb
	einheimisch	- LB: 7.3.2.1 (Gehölze kühl-feuchter Wälder)
Tiliaceae	Juni-Juli	
Vaccinium corymbosum	trocken-frisch, sauer-neutral	- Herbstfarbe scharlachrot bis bronze
Amerikanische Heidelbeere	Stecklinge	- Frucht blau, mit Wachsschicht überzogen, essbar
	Nordamerika	- Moorbeet
Ericaceae	April-Mai	- LB: 1.1.5.5 (Moor- und Sumpfgehölze)
Viburnum opulus	frisch-feucht, kalkliebend	- Wildhecken, Rabatten, Parkanlagen
Gemeiner Schneeball	Aussaat	- Herbstfärbung weinrot
	einheimisch	- Frucht scharlachrot, bleiben bis in Winter hängen
Caprifoliaceae	Mai-Juni	- LB: 2.2.6.4 (Auen- und Ufergehölze)
Viburnum plicatum	frisch-feucht, nährstoffreich	- verschiedene Sorten (reine Art selten in Gärten)
Gefüllter Japanischer Schneeball	Stecklinge	- Solitär, Gruppen, Parkanlagen,
	Japan	- Herbstfärbung dunkelrot
Caprifoliaceae	Mai-Juni	- LB: 9.3.2.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)

B.5. Gehölze (total 151 Pflanzen)

Sommergrüne Laubgehölze

<i>Gattung Art (Sorte/Varietät/Unterart)</i>	<i>Boden</i>	
<i>Deutscher Name</i>	<i>Vermehrung</i>	
<i>Synonym</i>	<i>Heimat</i>	<i>Verwendung/Besonderes</i>
<i>Familie</i>	<i>Blütezeit</i>	
Viburnum x bodnantense	frisch-feucht, nährstoffreich	- Solitär, Tröge, Dachgärten
Bodnant-Schneeball, Winter-Viburnum	Stecklinge	- ein Teil der Blüten öffnet bereits bei mildem November
	Züchtung	- LB: 9.3.2.5 (Gehölze der Hecken und Strauchflächen)
Caprifoliaceae	Januar-März	